

Reemergència de la sífilis i coinfecció amb VIH a Barcelona: una combinació perillosa

Martí Vall i Mayans

Director de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual, CAP Drassanes, Servei Català de la Salut

Després d'anys de continu descens de la incidència de la sífilis, recentment s'han documentat increments de casos de sífilis infecciosa (primària, secundària i latent precoç) en ciutats europees —incloent-hi Barcelona— i nord-americanes. L'augment, que ha afectat sobretot a homes homosexuals, és preocupant perquè una proporció elevada dels casos estaven també infectats pel VIH. Les raons d'aquest canvi de tendència són complexes, però es deuen a canvis de comportaments de risc —incloent-hi l'ús d'Internet per citar-se—, moviments migratoris, contactes entre diferents grups poblacionals, ús de drogues diverses i disminució de les pràctiques sexuals segures en homes homosexuals coincidint amb la introducció de la teràpia antiretroviral de gran activitat. La immunitat protectora parcial causada per la sífilis també podria explicar la dinàmica natural de la incidència de la sífilis en cicles d'uns deu anys.

Breu CV de Martí Vall i Mayans

Llicenciat (1982) i doctor (1989) en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); especialista en medicina preventiva i salut pública. Director des del 2001 de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual, CAP Drassanes, Servei Català de la Salut. Coautor de més de quaranta publicacions. Ha estudiat l'epidemiologia i prevenció de diferents malalties infeccioses, com ara l'hepatitis vírica, la sida, altres malalties de transmissió sexual o la tuberculosi. La seva àmplia experiència en medicina preventiva i salut pública li ha permès participar com a consultor en diferents programes de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), com ara en el Programa Global de Vacunes i Immunització i en el Programa de Tractament i Prevenció de la Sida.